

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8

Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав дигітоксин; в процесі дигіталізації з'явилися такі симптоми: головний біль, нудота, діарея, втрата апетиту, порушення кольорового сприйняття, брадикардія. Який антидот доцільно призначити для зменшення симптомів інтоксикації?

Унітіол
Атропіну сульфат
Преднізолон
Адреналіну гідрохлорид
Налоксон

У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Для корекції кислотно-лужного стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:

Бікарбонату натрію
Хлориду натрію
Глюкози
Хлориду калію
Хлориду кальцію

Хворий 33-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на те, що після лікування солями важких металів у нього з'явилися сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини. Який засіб слід застосувати для усунення побічних ефектів?

Унітіол
Налоксон
Калію перманганат
Метиленовий синій
Діамантовий зелений

Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив спиртовий розчин невідомого виробника. За даними проведеного обстеження діагностовано отруєння метиловим спиртом. Який антидот необхідно використати в даному випадку?

Етанол
Тетурам
Налоксон
Протаміну сульфат
Ацетилцистеїн

Юнак 15-ти років доставлений до приймального відділення у непритомному стані. Об'єктивно: на зовнішні подразники хворий не реагує, дихання періодичне за типом Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені використанням морфіну. Назвіть засіб для антидотної терапії:

Налоксон
Унітіол
Апоморфіну гідрохлорид
Кальцію хлорид
Протаміну сульфат

До реанімаційного відділення надійшов хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунку?

Калію перманганат
Натрію гідрокарбонат
Розчин фурациліну
Розчин натрію хлориду
Борна кислота

Хворий на гіпертонічну хворобу разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами, довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого?

Гіпохлоремічний алкалоз
Метаболічний ацидоз
Гіперкаліємія
Гіпермагніємія
Збільшення об'єму циркулюючої крові

При отруєнні невідомим препаратом у пацієнта спостерігались сухість слизової оболонки рота та розширення зіниць. З яким впливом пов'язана дія цього препарату?

Блокада М-холінорецепторів
Стимуляція М-холінорецепторів
Стимуляція Н-холінорецепторів
Стимуляція адренорецепторів
Блокада адренорецепторів

До токсикологічного відділення надійшов хворий з симптомами гострого отруєння сполуками ртуті. Який препарат необхідно призначити у якості антидоту?

Унітіол
Трифтазин
Нейромедин
Баррол
Плантаглюцин

Дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу
Для стимуляції дихання
Для нормалізації артеріального тиску
Для інактивації фенобарбіталу
Для пробуджуючого ефекту

У хворого на сифіліс при лікуванні препаратами вісмуту з'явилися сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб доцільно використати у хворого для лікування отруєння препаратами вісмуту?

Унітіол
Метиленовий синій
Налоксон
Бемегрид
Налорфін

Хворий з хронічним гіперацидним гастритом для усунення печії застосовує антацидний засіб, після прийому якого відзначає поліпшення, однак разом з тим виникає відчуття розпирання у шлунку. Який з наведених препаратів міг викликати вказаний побічний ефект?

- Натрію гідрокарбонат
- Магнію окис
- Магнію трисилікат
- Алюмінію гідроокис
- Пепсин

До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічним кризом, йому внутрішньовенно ввели антигіпертензивний засіб - сіль лужноземельного металу. Який препарат ввели хворому?

- Магнію сульфат
- Калію хлорид
- Натрію гідрокарбонат
- Кальцію лактат
- Натрію бромід

У хворого 35-ти років, який часто вживає алкоголь, на фоні лікування сечогінними засобами, виникли сильна м'язова і серцева слабкість, блювання, діарея, АТ- 100/60 мм рт.ст., депресія. Причиною такого стану є посилене виділення з сечею:

- Калію
- Кальцію
- Натрію
- Фосфатів
- Хлору

В результаті інфікування рани після видалення зуба у хворого виникло її нагноєння. Для очищення рани, як один із засобів, рекомендовано полоскання рота гіпертонічним розчином NaCl. Який процес лежить в основі цього способу очищення?

- Осмотична активність солі
- Денатурація білка
- Бактерицидна дія
- Гемостатична дія
- Механічне очищення

Унітіол є антидотом і застосовується, зокрема, у разі отруєнь солями важких металів. Як називається такий тип взаємодії лікарських речовин?

- Хімічний антагонізм
- Синергоантагонізм
- Фізичний антагонізм
- Неконкурентний антагонізм
- Фізіологічний антагонізм

З хімічного виробництва до токсикологічного відділення доставлено чоловіка з отруєнням ртуттю. Який препарат слід використати у цій ситуації?

- Унітіол
- Активоване вугілля
- Ентеросорбент СКН
- Ізонітрозин
- Налоксон

