

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5

Хворому на хронічний бронхіт призначили муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який препарат був використаний?

Амброксол
Кодеїн
Мукалтин
Фенотерол
Лібексин

Жінці 50-ти років, яка хворіє на тромбофлебіт, ввели гепарин, що спровокував кишкову кровотечу. Який препарат потрібно призначити?

Протаміну сульфат
Натрію цитрат
Кислоту амінокапронову
Стрептокіназу
Вікасол

Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на кашльовий центр вибірково, не пригнічує дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте цей препарат:

Глауцину гідрохлорид
Кодеїну фосфат
Лібексин
Окселадин
Бромгексин

У відділення надійшла дитина з носовою кровотечею та меленою в калі. Зі слів матері, відбулося отруєння дитини кумаринами, які застосовувалися для боротьби з щурами. Введення якого засобу припинить кровотечу у дитини?

Вікасол
Фраксипарин
Фепранон
Тромбін
Адреналін

Дитина 8 років готувалася до тонзилектомії. Аналіз крові показав, що час згортання збільшено (до 7 хвилин). Який препарат за 5 днів до операції слід включити до комплексу лікарських засобів підготовчого періоду в першу чергу?

Вікасол
Кальцію хлорид
Амінокапронову кислоту
Фібриноген
Дицинон

Хворий похилого віку страждає на хронічний закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечника. Який препарат слід призначити хворому?

Бісакодил
Натрію сульфат
Касторова олія

Ацеклідин
Прозерин

У хворого 37-ми років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності факторів згортання крові II, VII, IX, X, подовження часу згортання крові. Недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни?

Вітамін К
Вітамін А
Вітамін С
Вітамін D
Вітамін Е

Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з'явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?

Протаміну сульфат
Вікасол
Амінокапронова кислота
Неодикумарин
Фібриноген

Хворому з метою попередження жирової дистрофії печінки лікар призначив ліпотропний препарат - донор метильних груп. Це імовірно:

S-Аденозилметіонін
Холестерин
Білірубін
Валін
Глюкоза

Чоловік 40 років хворіє на гіперацидний гастрит з нічними голодними болями. Призначте хворому лікарський засіб - блокатор гістамінових H₂-рецепторів III покоління, який знизить виділення хлористоводневої кислоти (особливо вночі) та збільшить утворення захисного слизу:

Фамотидин
Пірензепін
Метацин
Атропіну сульфат
Платифіліну гідротартрат

Лікар призначив пацієнту з хронічним бронхітом відхаркувальний засіб, який діє шляхом розщеплення дисульфідних зв'язків глікозаміногліканів харкотиння, зменшуючи цим його в'язкість, проте попередив хворого про можливий бронхоспазм при його використанні. Який засіб був призначений?

Ацетилцистеїн
Лібексин
Бромгексин
Трава термопсису
Натрію гідрокарбонат

Препарат "Гептрал", який використовують при хворобах печінки, містить S-аденозилметіонін. Ця активна амінокислота бере участь у синтезі:

Фосфоліпідів

Жовчних кислот

Триацилгліцеролів

Холестерину

Гему

При обстеженні чоловіка 40-ка років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?

Ферковен

Ціанокобаламін

Пентоксил

Гепарин

Вікасол

Хвора 66-ти років скаржиться на біль у гомілці, який підсилюється при ходьбі. Об'єктивно: набряк та почервоніння по ходу вени. Лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання. Який препарат можна використати з цією метою?

Мазь гепаринова

Мазь саліцилова

Мазь троксевазінова

Мазь бутадіонова

Тромбін

До лікаря акушера-гінеколога звернулась вагітна жінка, у якої діагностували мегалобластну анемію. Який з нижченаведених засобів доцільно призначити?

Ціанокобаламін

Пентоксил

Метилурацил

Глауцин

Стрептокіназа

Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасилол (контрикал, гордокс), який є інгібітором:

Трипсину

Еластази

Карбоксипептидази

Хімотрипсину

Гастриксину

У хірургічне відділення лікарні надійшла хвора з явищами гострого панкреатиту: блювання, пронос, сильний оперізуючий біль, слабкість, гіпотонія, зневодненням організму. Який препарат з антиферментною активністю показаний хворому?

Контрикал

Анальгін

Адреналін

Атропіну сульфат

Натрію гідрокарбонат

Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом: гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?

Контрикал
Трипсин
Хімотрипсин
Панкреатин
Фібринолізин

До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Об'єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами беладони. Який лікарський засіб доцільно застосувати?

Прозерин
Ацеклідін
Пілокарпін
Армін
Дипіроксим

До стаціонару надійшов хворий з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення, виразка цибулини 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюючої функцій шлунка. Оберіть препарат, що знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:

Фамотидин
Атропіну сульфат
Метацин
Платифілін
Екстракт беладони сухий

Хворому, який переніс інфаркт міокарда, призначена ацетилсаліцилова кислота по 75 мг щоденно. З якою метою призначено препарат?

Зменшення агрегації тромбоцитів
Зменшення запалення
Зменшення болю
Зниження температури
Розширення коронарних судин

При підготовці до видалення зуба стоматолог порекомендував пацієнтові з метою профілактики кровотечі приймати препарат. Який засіб був рекомендований?

Вікасол
Гепарин
Аспаркам
Магнію сульфат
Димедрол

Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний муколітичний препарат, який сприяє розріджуванню харкотиння. Назвіть цей препарат:

Ацетилцистеїн
Діазепам
Гепарин
Фуросемід

Еналаприл

Хворому на гіпертонічну хворобу лікар запропонував засіб, який припиняє тромбоутворення, вводиться парентерально. Оберіть цей засіб:

Гепарин

Амбен

Протаміну сульфат

Неодикумарин

Синкумар

Ліквідатора аварії на АЕС, який отримав опромінення, стало турбувати блювання, яке виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому?

Метоклопрамід

Атропін

Де-нол

Аерон

Резерпін

Лікар-гематолог призначив пацієнту з кровотечею коагулянт, який діє шляхом підвищення синтезу протаміну та інших факторів зсідання крові переважно в печінці, є синтетичним водорозчинним вітаміном. Який препарат призначив лікар?

Менадіону натрію бісульфіт

Тромбін

Етамзилат

Гепарин

Кальцію хлорид

Аспірин інгібує синтез простагландинів, завдяки блокуванню активності циклооксигенази. Яка жирна кислота необхідна для цього синтезу?

Арахідонова

Пальмітинова

Ліноленова

Стеаринова

Лінолева

Хворому 50-ти років після операції з метою прискорення загоєння рани місцево був призначений препарат, який має репаративну та імуностимулюючу активність. Визначте препарат:

Метилурацил

Циклоспорин

Меркаптопурин

Дексаметазон

Діазолін

У хворого після резекції шлунка розвинулась мегалобластична анемія. Який препарат необхідно призначити хворому?

Вітамін В12

Ферковен

Заліза лактат

Вітамін В6
Аскорбінову кислоту

У 6-ти місячної дитини спостерігались часті та сильні підшкірні кровотечі. Призначення синтетичного аналога вітаміну К (вікасола) дало позитивний ефект. В гамма-карбоксилюванні глютамінової кислоти якого з перерахованих нижче білків загортальної системи крові бере участь цей вітамін?

Протромбіну
Фібриногену
Антигемофільного глобуліну А
Фактора Хагемана
Фактора Розенталя

Чоловік 35 років звернувся до лікарні зі скаргою на носові кровотечі. Лікар призначив пацієнту препарат, який є коагулянтom непрямого типу дії. Визначте цей препарат:

Вікасол
Кислота амінокапронова
Тромбін
Заліза сульфат
Фраксипарин

Пацієнту діагностовано хронічний бронхіт та призначено муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який лікарський засіб було використано для лікування пацієнта?

Амброксол
Лібексин
Кодеїн
Мукалтин
Фенотерол

Восьмирічній дитині рекомендовано проведення тонзилектомії. Лабораторний аналіз крові виявив, що час згортання крові збільшено до 7 хвилин. Який лікарський засіб треба призначити дитині для зменшення крововтрати під час операції?

Вікасол
Кальцію хлорид
Фібриноген
Дицинон
Амінокапронову кислоту

У пацієнта похилого віку спостерігається хронічний закреп через гіпотонію товстого кишечника. Який лікарський засіб треба йому призначити?

Бісакодил
Прозерин
Касторову олію
Ацеклідін
Натрію сульфат

Укажіть, що **НЕ ХАРАКТЕРНО** для низькомолекулярних гепаринів (єноксапарин, фраксипарин та ін.)

Відсутня інгібуюча дія на тромбін

Біодоступність вище, ніж у гепарину

Уводять підшкірно 1-2 рази на добу

Антиагрегантна і антикоагулянтна активність

Посилюють гальмівну дію антитромбіну III на фактор X

До комплексної терапії пацієнта з бронхопневмонією, яка супроводжується виснажливим сухим кашлем, лікар призначив муколітичний препарат, що де полімеризує мукопротеїди.

Укажіть цей препарат.

Ацетилцистеїн

Атенолол

Кодеїн

Неодикумарин

Строфантин

У пацієнта діагностовано мегалобластичну анемію. Укажіть сполуку, недостатня кількість якої може призводити до розвитку цієї хвороби.

Ціанокобаламін

Холекальциферол

Магній

Гліцин

Мідь

Препарат «Гептрал», який використовують при хворобах печінки, містить S-аденозилметіонін. У синтезі яких біологічних сполук бере участь ця активна амінокислота?

Фосфоліпідів

Холестерину

Триацилгліцеролів

Жовчних кислот

Гему

Укажіть препарат, що знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H₂-гістамінових рецепторів.

Фамотидин

Атропін

Омепразол

Метронідазол

Метацин

У пацієнтки, яка приймає неодикумарин у зв'язку із тромбофлебітом, виникла кровоточивість. Який препарат необхідно призначити?

Вікасол

Дипіридамоп

Ацетилсаліцилова кислота

Пентоксифілін

Протаміну сульфат

У шестимісячної дитини спостерігалися часті та сильні підшкірні кровотечі. Призначення синтетичного аналога вітаміну К (вікасола) дало позитивний ефект. У γ -карбоксилюванні глутамінової кислоти якого з нижченаведених білків загортальної системи крові бере участь цей вітамін?

Протромбіну

Фібриногену

Фактора Резенталя

Антигемофільного глобуліна А

Фактора Хагемана